

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Würzburg
Direktor: Prof. Dr. med. E. W o l l h e i m

STANFORD-LANE MEDICAL LIBRARY

Das Verhalten

=====

der neutralen C-17 Ketosteroidausscheidung

=====

unter Tonephinbelastung

=====

I n a u g u r a l - D i s s e r t a t i o n

verfaßt und der

Hohen Medizinischen Fakultät

der

Julius - Maximilians - Universität Würzburg

zur

Erlangung der medizinischen Doktorwürde

vorgelegt von

Hubert Förster²

aus Guben

Würzburg 1955

Aus der Medizinischen Universitätsklinik Würzburg
Direktor: Prof. Dr. med. E. W o l l h e i m

Das Verhalten
=====

der neutralen C-17 Ketosteroidausscheidung
=====

unter Tonephinbelastung
=====

I n a u g u r a l - D i s s e r t a t i o n
verfaßt und der
Hohen Medizinischen Fakultät
der
Julius - Maximilians - Universität Würzburg
zur
Erlangung der medizinischen Doktorwürde
vorgelegt von
Hubert Förster
aus Guben

Tag der mündl. Prüfung:
14. Okt. 1955
Würzburg 1955

Referent: Priv. Doz. Dr. med. J. S c h u n k

Korreferent: Prof. Dr. med. E. W o l l h e i m

Gedruckt mit Genehmigung der Medizinischen Fakultät
der Universität Würzburg

Meinem Onkel
Herrn Pater Direktor A.Klinski
in Dankbarkeit gewidmet



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA40153517_0062

Das Verhalten

der neutralen C-17 Ketosteroidausscheidung

unter Tonephinelastung.

E i n l e i t u n g

In der Lehre vom " Allgemeinen Adaptationssyndrom " (S e l y e u. Mitarb.) wird die korrelative Verknüpfung zwischen Hypophysenvorderlappen (HVL) und Nebennierenrinde (NNR) eindeutig herausgestellt, die seitdem von vielen Autoren bestätigt worden ist (G e m z e l l u. Mitarb.; S y d n o r u. S a y e r s ; T a y l o r u. Mitarb.; G. u. M. S a y e r s ; B o g u t h u. Mitarb.; L i e b e g o t t ; J. B a u e r u. K a r l ; K i t c h e l l u. W e l l s ; R a b i n o v i c i ; S t e b b i n s ; T h o r n u. Mitarb.; T o n u t t i). Sowohl F o r t i e r als auch H u m e und W i t t e n s t e i n , S l u s h e r und R o b e r t s vermuten sogar eine hypothalamische zentrifugale nervale Steuerung der HVL-Funktion, worauf eine Reihe anatomischer Befunde hinweist (S p a n n e r ; R o m e i s ; H i l l a r p und J a c o b s o h n ; W e s t m a n ; M a t u z ā l s).

Ähnliche Beziehungen, doch in ihrer Art wesentlich problematischer, scheinen zwischen Hypothalamus-Hypophysen-

hinterlappen-System und NNR zu bestehen. Dabei bleibt zu diskutieren, ob es gerechtfertigt ist, von Hypophysenhinterlappenhormonen zu sprechen. Bekanntlich weisen die Untersuchungen von E. u. B. S c h a r r e r sowie B a r g m a n n und seiner Schule daraufhin, daß der Hypophysenhinterlappen (HHL) lediglich Stapelort dieser Hormone ist, während als Bildungsstätten die Nuclei supra-optici und paraventriculares in Frage kommen, aus denen sie auf einer neurosekretorischen Bahn in den HHL gelangen. Für eine hypothalamische Bildung oder sogar Abgabe treten auch M i r s k y u. Mitarb. ein. Somit läge das Problem mehr in Richtung einer Beziehung des Hypothalamus zur Nebennierenrinde. Dabei taucht die Frage auf, ob diese direkt durch die sogenannten HHL-Hormone gegeben ist oder über die Adenohypophyse vermittelt wird.

Eine korrelative Verknüpfung zwischen Hypothalamus, Hypophysenhinterlappen und Nebennierenrinde kommt dadurch zum Ausdruck, daß nach Adrenalektomie (B i r n i e u. Mitarb.; M i r s k y u. Mitarb.; B o s s u. Mitarb.; F r o s t u. T a l m a g e) und bei Addisonkranken (L l o y d u. L o b o t z k y) ein erhöhter Adiuretinspiegel nachgewiesen werden kann, während nach Hypophysektomie kein antidiuretisches Hormon im Serum aufgefunden wird (A m e s u. v a n D y k e). Auf den Natriumhaushalt

(S a r t o r i u s u. R o b e r t s ; B i r n i e)
und die Diurese (C o r e y u. Mitarb.; E. G. H o f -
m a n n) wirken Adiuretin und Nebennierenrinden-Extrakt
antagonistisch, auf die Kaliumausscheidung aber syner-
gistisch (S a r t o r i u s u. R o b e r t s ;
M a r e n z i).

Ebenso kann durch morphologische Untersuchungen eine
wechselseitige Beziehung zwischen Hypothalamus-Hypophysen-
hinterlappensystem und Nebennierenrinde bestätigt werden.
Nach beidseitiger Adrenalektomie fanden E i c h n e r sowie
M a l a n d r a u. C o r b e t t a eine Abnahme des
Neurosekretes (B a r g m a n n), das als Trägersubstanz
der HHL-Hormone anzusehen ist. Andererseits führt Belastung
mit 2 bis 2,5 %iger Kochsalzlösung zu Funktionsein-
schränkungen der Zona glomerulosa, aber zu Aktivitätsstei-
gerung der Zona fasciculata und des neurosekretorischen
Systems.

Auch durch Applikation von HHL-Hormonen lassen sich
Aktivitätszeichen der NNR feststellen (Z o c c h i ;
N a g a r e d a u. G a u n t ; K ü h n a u). Dafür
spricht auch die unter HHL-Extrakten, z.B. Hypophysin
oder Tonephin, auftretende Eosinopenie (R u p p e l u.
H i t z e l b e r g e r). Dieser Abfall der eosinophilen
Leukocyten bleibt nach Hypophysektomie aus, so daß E s e r
u. S i p a h i o g l u ihn als HVL-Effekt auffassen.

Dementsprechend konnten Mc C a n n u. B r o b e c k ,
ferner Mc C a n n u. S y d n o r durch Zerstörung des
Tractus supraoptico - hypophyseus, des Transportweges der
Hypothalamushormone, die ACTH-Produktion vermindern und
durch Vasopressinzufuhr wieder normalisieren, nicht aber
durch Oxytocin, Histamin oder Adrenalin. Auf diese Akti-
vierung des HVL durch das Neurosekret der hypothalamischen
Kerne wies auch E. S c h a r r e r auf Grund seiner histo-
logischen Befunde hin.

Ziel eigener Untersuchungen war die Erfassung einer
Nebennierenrindenaktivierung mit HHL-Hormon durch Bestim-
mung der neutralen C-17-Ketosteroide. Wir benutzten dazu
Tonephin, das neben einem tonisierenden Effekt auf Gefäß-
und Darmmuskulatur insbesondere das antidiuretische Wirkungs-
prinzip besitzt. Zur besseren Deutung der Tonephinwirkung
wurden vereinzelt zusätzliche Belastungen mit ACTH durchge-
führt.

Die neutralen C-17-Ketosteroide sind hauptsächlich Abbau-
Produkte der androgenen NNR-Hormone und des Testosterons,
während die Ovarien unwesentlich an ihrer Bildung beteiligt
sind (B o r e l l). Die eigentlichen Corticosteroide er-
scheinen ebenfalls bis zu einem gewissen Prozentsatz als C-17-
Ketosteroide im Harn (L a b h a r t ; B u r s t e i n u.
Mitarb.; B i r k e u. Mitarb.; Z i m m e r m a n n).

Diese Metaboliten setzen sich vor allem aus Androsteron

und Ätiocholanolon als Testosteronaabkömmlinge¹ und 11-Hydroxyandrosteron, 11-Hydroxyätiocholanolon und Dehydroisoandrosteron als NNR-Derivate zusammen (M a r t i) und sind ein guter Maßstab für die NNR-Funktion.

M e t h o d i k

Zur Festlegung der Ausgangswerte wurde an drei aufeinanderfolgenden Tagen der 24-Stunden-Harn von 8 - 8 Uhr gesammelt, gemessen und sein Gehalt an neutralen C-17-Ketosteroiden nach der Z i m m e r m a n n 's c h e n Methode in der Modifikation nach R u p p e r t bestimmt. Mit dieser Reaktion werden " alle 17-Ketosteroide - unabhängig von ihrer biologischen Aktivität - erfaßt " (Z i m m e r m a n n).

50 ccm von 1 l. Harn werden mit 5 ccm konz.HCL hydrolysiert und anschließend mit Äther durch Schütteln im Scheidetrichter extrahiert. Durch konz. Sodalösung, 10%ige Natronlauge und Aqua dest. entfernt man störende Begleitstoffe. Danach wird der Äther abgedampft, der Rückstand zur Trockne gebracht und anschließend in 10 ccm absolutem Alkohol gelöst. 2 ccm dieser Lösung werden in 2 ccm 3/n Kalilauge mit 2 ccm 2%iger m-Dinitrobenzollösung angefärbt, 55 Minuten lang bei 25°C in einer Dunkelkammer aufbewahrt und anschließend zur Eliminierung störender Chromogene (Z i m m e r m a n n , F o n t i u s) mit 2 ccm Äther (R u p p e r t)

versetzt, wodurch eine Abscheidung der Kalilauge als wässrige Phase erreicht wird. Durch Zugabe von Na_2S wird die wässrige Phase beseitigt und durch Filtrieren erhält man dann die fertige Kolorimetrierlösung, die aus $\frac{2}{3}$ Alkohol und $\frac{1}{3}$ Äther besteht, wobei das Gesamtvolumen der ursprünglich angesetzten Farblösung nicht verändert ist. Am Stufenphotometer wird 60 Minuten nach Ansetzen der Farblösung der Extinktionswert bei der Wellenlänge 500 m μ abgelesen und an Hand einer Eichkurve der C-17-Ketosteroidgehalt pro Liter direkt abgelesen.

Von einer festgesetzten Trinkmenge wurde abgesehen, Extreme jedoch vermieden, da einerseits bekannt ist, daß vermehrte Wasseraufnahme die NNR stimuliert (N a g a - r e d a u. G a u n t ; L l o y d u. L o b o t s k y ; P. U. H. D a n f o r d), während andererseits durch Dursten das neurosekretorische System aktiviert wird (H i l d u. Z e t l e r ; E i c h n e r ; O r t m a n n). Während der Versuchsphase wurde Bettruhe eingehalten und jegliche medikamentöse oder physikalische Behandlung bereits drei Tage vor der ersten Untersuchung eingestellt. Nach Bestimmung dreier Ausgangswerte, wurde mit Tonephin subcutan nach folgendem Schema belastet:

1. Tag: 8 Uhr 9 V.E. Tonephin

12 Uhr, 18 Uhr, 24 Uhr je 6 VE Tonephin

2. Tag: 6 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr, 24 Uhr je 6 VE Tonephin

3. Tag: 6 Uhr 6 VE Tonephin

Damit erhielten also die Probanden innerhalb von 46 Stunden insgesamt 57 VE Tonephin.

Nach Beginn der Belastung wurden mindestens drei Ketosteroidbestimmungen durchgeführt, die erste fiel auf den 2. Belastungstag.

Für die ACTH-Belastung fand der übliche Modus Anwendung:

1. Tag: 8 Uhr 25 IE ACTH


12 Uhr, 18 Uhr, 24 Uhr je 10 IE ACTH

2. Tag: 6 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr, 24 Uhr je 10 IE ACTH

3. Tag: 6 Uhr 10 IE ACTH

Die Untersuchungen führten wir an Frauen durch, um den Testosteronanteil der C-17-Ketosteroide auszuschließen. Lediglich ein 15 jähriger junger Mann wurde belastet.

Die vom Alter und Geschlecht abhängige Ausscheidung dieser Metaboliten geht aus Abbildung 1 hervor.



E r g e b n i s s e :

In den folgenden Diagrammen sind die Ausscheidungsverhältnisse der neutralen C-17-Ketosteroide und der 24-Stunden-Harnmenge registriert.


Bei einer Gesamtzahl von 37 Probanden blieben unter Tonephinbelastung die Ausscheidungswerte der 17-Ketosteroide in 23 Fällen, das sind 62,2% unverändert, an 12 Patienten (= 32,4%) war ein eindeutiger Abfall dieser Metaboliten nachzuweisen, während bei den restlichen 2 Untersuchten (= 5,4%) die Werte anstiegen.

Die 24-Stunden-Harnmenge blieb im wesentlichen durch Tonephin unbeeinflusst. Allerdings wurde - wie bereits hervorgehoben - die Flüssigkeitszufuhr nicht festgelegt, so daß also Erwägungen wie etwa bei der Hypophysin-Wasserbelastung nicht angestellt werden können.

Von den neun Patienten mit geringen Krankheitssymptomen (Rekonvaleszenten und vegetativ Labile), die alle normale Ausgangswerte hatten, zeigten 3 unter Tonephin einen 2-3 Tage anhaltenden Abfall der 17-Ketosteroide um 3-4 mg. Ein Anstieg trat bei keinem Probanden auf. Die übrigen 6 Fälle blieben unbeeinflusst.

Die Gruppe der Hepatitis-Kranken war durch relativ niedrige 17-Ketosteroidmengen und durch stärkere Spontanschwankungen der Ausgangswerte, wie sie in diesem Ausmaß


17-KETOSTEROIDE




787/55-31J

Vegetative Dystonie

24-STD-HARN




17-KETOSTEROIDE







1042/55-33J



Vegetative Dystonie


24-STD-HARN













24-KETOSTEROIDE




2545/54-16J

Hepatitis infectiosa
(Anfang der Erkrankung)

24-STD-HARN




24-KETOSTEROIDE





454/55-29J

Hepatitis infectiosa
(Anfang der Erkrankung)

24-STD-HARN





17-KETOSTEROIDE


24-STD.-HARN

50
mg

TONEPHIN
57 VE

2547/54-67J

Hepatitis infectiosa
(Ende der Erkrankung)



2000
ccm

0 2 4 6 8 10 TAGE

17-KETOSTEROIDE


24-STD.-HARN

50
mg

TONEPHIN
57 VE


2639/54-44J





Hepatitis infectiosa
(Ende der Erkrankung)







2000
ccm


0 2 4 6 8 10 TAGE














bei anderen Fällen nicht beobachtet wurden, gekennzeichnet. Infolgedessen erscheint es problematisch, die Belastungswerte zur Beurteilung des Tonephin-Effektes heranzuziehen. Lediglich Fall 455/55 zeigte eine deutliche Depression von zwei Tagen, während eine andere Hepatitiskranke (2639/54) einen mehrtägigen Anstieg nach Tonephin aufwies, der wohl als Belastungseffekt aufgefaßt werden muß.

Die 7 Adipositas-Fälle waren zwar in ihrer Genese uneinheitlich, jedoch lagen ihre C-17-Ketosteriodwerte generell an der oberen Grenze der Norm. Bei den meisten Fällen ließen sich familiäre Anhaltspunkte eruieren (439/54; 1312/54; 1318/54; 1321/54; 2012/54). Eine Patientin zeigte außer der Fettsucht noch eine Hyperostosis frontalis und Zyklusstörungen, so daß sie wohl in die Morgagni-Gruppe einzuordnen ist. Eine weitere bot neben einer vorwiegend auf den Stamm und das Gesicht lokalisierten Fettsucht einen Hochdruck, so daß sie als oligosymptomatischer Cushing angesehen werden kann.

Unter Tonephin trat in keinem dieser Fälle ein Abfall der 17-Ketosteroide auf, ein eindeutiger Anstieg war dagegen bei 1 Untersuchten (439/54) zu verzeichnen, während die übrigen 6 Versuchspersonen unbeeinflusst blieben.

Die restliche Gruppe von 14 Fällen bot ausgesprochene endokrine Symptome. Davon hatten 7 Fälle eindeutige Zeichen einer Nebennierenrindenüberfunktion, die sowohl in





17-KETOSTEROIDE

50
mg

TONEPHIN
57 VE

459/54-390

NNR-Hyperplasie
Rachitischer Zwergwuchs

24-STD-HARN

2000
ccm

0 2 4 6 8 10 TAGE

17-KETOSTEROIDE

50
mg

TONEPHIN
57 VE

1299/54-360


NNR-Hyperplasie
Diabetes mellitus

24-STD.-HARN

2000
ccm

0 2 4 6 8 10 TAGE


17-KETOSTEROIDE




1327/54-28J

NNR-Hyperplasie
Virilismus

24-STD-HARN




17-KETOSTEROIDE




1347/54-34J

NNR-Hyperplasie
Virilismus


24-STD-HARN





1483/54-19J

Ovarieller Zwergwuchs



1500/54-18J

Hypophys. Zwergwuchs

erhöhten C-17-Ketosteroidwerten als auch in anderen klinischen Symptomen zum Ausdruck kam. Während es sich bei Fall 2090/54 um ein Adenom gehandelt haben dürfte, da auf ACTH-Belastung kein signifikanter Anstieg der 17-Ketosteroide erfolgte, im übrigen auch keine Reaktion auf Tonephin eintrat, waren die restlichen 6 Fälle als Hyperplasien anzusehen. Ihre C-17-Ketosteroidausscheidung sank nach Tonephin erheblich ab, und zwar um 6 bis 12 mg. Bei den auch mit ACTH belasteten Fällen (1960/54 u. 1374/54) stieg sie erwartungsgemäß an.

Eine Depression ähnlichen Ausmaßes unter Tonephin fanden sich bei 2 Fällen mit ovariellen und hypophysären Zwergwuchs (1483/54, 1500/54), von denen der erstere Ausgangswerte an der unteren, der letztere solche an der oberen Grenze der Norm aufwies. Beide zeigten unter ACTH-Belastung einen guten Anstieg.

Ein Fall von Hypophysen-Unterfunktion mit sekundärer Nebennieren-Insuffizienz und entsprechend erniedrigten C-17-Ketosteroidwerten blieb durch Tonephin unbeeinflusst, während er auf ACTH ausreichend ansprach.

Ebenso trat bei dem Myxödem, das allerdings schon unter Schilddrüsen - Hormonbehandlung stand und normale C-17-Ketosteroide ausschied, kein Tonephin-Effekt ein.


Die übrigen 3 Frauen befanden sich in der Menopause.

17-KETOSTEROIDE

24-STD-HARN


17-KETOSTEROIDE

24-STD-HARN



1977/55-34J


Hypophysäre Insuff.
sek. NNR-Insuff.



TONEPHIN 57 VE

2544/54-37J

Myxödem
z. Zt. der Behandlung.




17-KETOSTEROIDE




1351/54-43J

Klimakterischer Virilismus

24-STD.-HARN




17-KETOSTEROIDE




1052/54-51J

Klimakterischer Virilismus

24-STD.-HARN





Neben subjektiven Beschwerden lagen leichtere Virilisierungserscheinungen vor, außerdem bestand bei einer Patientin ein mittelschwerer Diabetes mellitus (1304/54). Bei allen Dreien ergaben sich gering erhöhte C-17-Ketosteroide, jedoch blieb die Tonephin-Applikation ohne Einfluß.

Besprechung der Ergebnisse.

Eine Aktivierung der NNR unter Tonephin, wie sie auf Grund der eingangs erwähnten experimentellen Arbeiten möglich gewesen wäre, hätte sich vermutlich mit erhöhter C-17-Ketosteroidausscheidung nachweisen lassen. Ein solcher Effekt fand sich jedoch eindeutig nur in etwa 5% der Fälle.

Bei den meisten Untersuchten änderte sich unter Tonephinbelastung die Ausscheidung nicht, ca. 1/3 sank sogar beträchtlich ab. Da die Spontanschwankungen der C-17-Ketosteroid-Exkretion bereits 20% betragen (A p p e l), wurden nur solche Werte als Veränderung registriert, die außerhalb dieser physiologischen Schwankungsbreite lagen.

Die eindeutigsten und regelmäßigsten Senkungen der C-17-Ketosteroide fanden sich bei NNR-Hyperplasien und den Fällen mit Zwergwuchs. Da diese Probanden eine außerordentlich gute ACTH-Ansprechbarkeit zeigten, die jeweils erst nach

der Tonephinbelastung geprüft wurde, muß eine Hemmung der NNR zum mindesten in Erwägung gezogen werden. Allerdings bliebe die Möglichkeit, daß unter HHL-Hormonen ein vermehrter Verbrauch der C-17-Ketosteroid-Vorstufen im intermediären Stoffwechsel stattfände. W i l k i n s beispielsweise deutet den Abfall der C-17-Ketosteroide, den er unter bestimmten Belastungsbedingungen feststellte, in dieser Richtung. Auf Grund unserer Ergebnisse ist es kaum berechtigt, der Leberfunktion dabei eine besondere Rolle zuzuschreiben. Unsere Hepatitis-Serie wies zwar niedrige Ausgangswerte auf, wie sie auch von anderen Autoren beschrieben wurden (B o n g i o v a n n i und E i s e n m e n g e r; W i l l i a m s u. Mitarb.), eine weitere Senkung unter Tonephin trat jedoch nur bei 1 von 7 Fällen auf, während ein anderer sogar einen mehrtägigen deutlichen Anstieg zeigte.

Soweit überhaupt eine Beeinflussung der C-17-Ketosteroidausscheidung durch die Leber vorliegt, dürfte sie vorwiegend auf die testikulären C-17-Ketosteroide zurückzuführen sein (W e i s s b e c k e r), zumal andere Untersucher sogar extrahepatische Faktoren für die erniedrigte C-17-ketosteroid-Ausscheidung bei chronischen Lebererkrankungen verantwortlich machen (G r e c o u. Mitarb.).

Andererseits ist an eine verminderte Exkretion der C-17-Ketosteroide seitens der Nieren zu denken. Bekanntlich werden diese Metaboliten von den Tubuli sezerniert.

Ihre Ausscheidung kann beispielsweise durch Benemidm das auf diesen Teil des Nephrons einwirkt, gehemmt werden (S t a u d i n g e r). Ebenso greift das antidiuretische Prinzip des Hypothalamus bzw. des Hypophysenhinterlappens am distalen Tubulusabschnitt an (B i r n i e u. Mitarb.) und führt in erster Linie zu vermehrter Wasserrückresorption. Vielleicht bedingt diese erhöhte Rückresorption des Wassers eine verminderte Sekretionsleistung für die neutralen C-17-Ketosteroide! An und für sich hat die Harnmenge nur einen unwesentlichen Einfluß auf die Ausscheidungsmenge dieser Hormon-Abbauprodukte (Z i m m e r m a n n u. H o f s c h l a e g e r ; H a m b u r g e r ; A p p e l ; P i n c u s ; K a s s e n a a r u. Mitarb.; K o w a l e w s k i). Auch aus unseren Versuchen läßt sich kein gegenteiliges Verhalten ableiten, zumal sich die Wassermenge unter Tonephin nur in wenigen Fällen deutlich änderte (Anstieg: 1960/54 und 1040/55; Abfall: 2060/54 und 1483/54). Allerdings dürfte dieser Effekt darauf zurückzuführen sein, daß die Trinkmengen nicht festgelegt wurden.

Offen bleiben muß die Frage, warum nur an einem Teil der Probanden ein Depressionseffekt unter Tonephin auftrat, zumal sich dieser bei den verschiedensten Krankheitsbildern fand, wenn ihn auch die NNR-Hyperplasien und die beiden Fälle mit Zwergwuchs am eindrucksvollsten zeigten.

Schon diese Gegenüberstellung der beiden letzten endo-

krinen Störungen beweist, daß die NNR-Aktivität allein hierfür nicht maßgebend sein kann. Das geht auch daraus hervor, daß die Fälle mit Adipositas und klimakterischem Virilismus, deren Ketosteroidwerte an der oberen Grenze der Norm lagen - wie es auch andere Autoren bestätigen (B a h n e r ; S t r ö d e r u. Z e i s e l) -, ebenfalls keinen Abfall der C-17- Ketosteroide aufwiesen. Vielleicht ist an eine individuell verschiedene Inaktivierung oder Ausscheidung der HHL-Hormone zu denken, zumal die Auffassungen über die Wirkungsdauer injizierter HHL-Präparate weit auseinandergehen, die nach Angabe verschiedener Autoren zwischen einer halben und sieben Stunden liegt (S a r t o r i u s u. R o b e r t s ; W h i t e u. K u r t z ; F r i e d m a n u. Mitarb.; C r o w f o r d u. P i n k h a m ; G i n s b e r g u. H e l l e r).

Z u s a m m e n f a s s u n g

Zum Nachweis einer Aktivierung der Nebennierenrinde durch Hypophysenhinterlappen - (bzw. Hypothalamus -) Hormone wurde die Ausscheidung der neutralen C-17-Ketosteroide vor und nach 48 stündiger Tonephin-Belastung geprüft. Von 37 Probanden mit verschiedenen, vorwiegend endokrinen Krankheits-

bildern blieben bei 23 Untersuchten die C-17-Ketosteroide unbeeinflusst, während 12 einen deutlichen mehrtägigen Abfall aufwiesen. Nur 2 Patienten zeigten ein Ansteigen der C-17-Ketosteroide.

Die Erniedrigung der C-17-Ketosteroide war besonders eindeutig und anhaltend bei 6 NNR-Hyperplasien und bei 2 Fällen mit Zwergwuchs.

Eine Aktivierung der Nebennierenrinde durch Tonephin ist somit unwahrscheinlich, sofern nicht ein vermehrter Steroidverbrauch vorliegt. Die Depression der C-17-Ketosteroide unter Tonephin bei 1/3 der Fälle dürfte am ehesten auf einer Ausscheidungshemmung seitens der Nierentubuli beruhen, wobei offen bleiben muß, warum nur ein Teil der Probanden diesen Effekt zeigte.

An dieser Stelle ist es mir eine angenehme Pflicht, Herrn Privatdozenten Dr. J. S c h u n k für die freundliche Überlassung der Themas und seine stete Hilfsbereitschaft während der Entstehung dieser Arbeit aufrichtig zu danken.

Herrn Professor Dr. E. W o l l h e i m gilt sowohl für die Bereitstellung eines Arbeitsplatzes als auch für die Übernahme des Korreferates mein verbindlichster Dank.

L i t e r a t u r

- Ames , R.G. a. H.B. van Dyke : Endocrinol. 50, 350 (1952)
- Appel , W.: Z.exp. Med. 118, 269 (1952)
- Bahner , F.: Handbuch der Inneren Medizin.
Bd. VII/1. Berlin-Göttingen-
Heidelberg: Springer 1955, S.1049
- Bargmann , W.: Klin.Wschr. 1949, 617
- Z. Geburtshilfe u. Frauenheilk.
13, 193 (1953)
- Dtsch. Med. Wschr. 1953, 1535
- Das Zwischenhirn-Hypophysen-
System Berlin-Götting-Heidelberg:
Springer 1954
- Bauer , J. u. J. Karl: Dtsch. Med. Wschr. 1951, 1528
- Birke , G.A. a. L.O. Plantin: Acta endocrinol. 15, 61 (1954)
- Birke , G.: Acta endocrinol. 15, 17 (1954)
- Birnie , J.H.: Endocrinol. 52, 33 (1953)
- Birnie , J.H., W.R. Boss, W.J.
Eversole, S.M. Osborne a. R. Gaunt: Endocrinol. 47, 1 (1950)
- Birnie , J.H., R. Jenkins,
W.J. Eversole a. R. Gaunt: Proc. Soc. exper. Biol. a. Med.
70, 83 (1949)
- Boguth , W., H. Langendorff
u. E. Tonutti: Med. Welt 13, 408 (1951)
- Bongiovanni , A.M.a.
W.J. Eisenmenger: J. clin. Endocrinol. 11, 152 (1951)
- Borell , U.: Acta endocrinol. 17, 13 (1954)
- Boss , W.R., J.H. Birnie a.
R. Gaunt: Endocrinol. 46, 307 (1950)
- Burstein , S., K. Sevard a.
R.I. Dorfman: Endocrinol. 52, 448 (1953)

- Corey, E.I., H. Silvette a.
S.B. Britton: Am.J.Physiol. 125, 644 (1939)
- Crowford, J.D. a.
B. Pinkham: Endocrinol. 55, 699 (1954)
- Danford, P. a. H. Danford: Endocrinol. 47, 139 (1950)
- Dochies, J. a. Dreifus: Am.J.Med.Sci. 222, 538 (1951)
- Eichner, D.: Z.Zellforsch. 37, 406 (1952)
- Eser, S.: Zitiert: Kongr. Ztbl.Inn.Med.
146, 346 (1953)
- Eser, S. u. U. Sipahioğlu: Zitiert: Kongr.Ztbl.Inn.Med.
139, 49 (1952)
- Fortier, L.: Endocrinol. 49, 782 (1951)
- Friedman, S.M., M. Nakashima
a. C.L. Friedman: Am.J.Physiol. 179, 165 (1954)
- Frost, R.C. a. R.V. Talmage: Endocrinol. 49, 606 (1951)
- Gemzell, C.A., D.C. van Dyke,
C.A. Tobias a. H. Evans: Endocrinol. 49, 325 (1951)
- Ginsberg, M. a. H. Heller: J.Endocrinol. 9, 283 (1953)
- Greco, F., G.M.C. Masson a.
A.C. Corcoran: Endocrinol. 52, 474 (1953)
- Hamburger, Ch.: Acta endocrinol. 17, 116 (1954)
- Hild, W.: Virch.Arch. 319, 526 (1951)
- Hild, W. u. G. Zetler: Arch.exper.Path. u. Pharm.
213, 139 (1951)
- Hillarp, N.A. u.
D. Jacobsohn: Lunds Univ. Årsskr. N.F.Avd. 2
39, 1 (1943)
- Hofmann, F.G.: Endocrinol. 50, 206 (1952)
- Hume, D.M. a. G.J. Wittenstein: Zitiert nach Bargmann

- Kassenaar, A.,
L.G. Huis in't Veld, P. Siderius,
H.C. Seldenrath a. A. Querido: Acta endocrinol. 4, 79 (1950)
- Kitchell, R.L. a.
L.J. Wells: Endocrinol. 50, 83 (1952)
- Kowalewski, K.: Ann. de endocrinol. 11, 82 (1950)
- Kühnau, J.: Verh.Dtsch.Ges.Path. 36, 11 (1952)
- Labhart, A.: Probleme des Hypophysen-Nebennieren-
rinden-Systems, Berlin 1953, S.31
Helv.Med.Acta 5, 344 (1952)
- Liebegott, G.: Verh.Dtsch.Ges.Path. 36, 21 (1952)
- Lloyd, Ch.W. a. J. Lobotsky: J.clin. Endocrinol. 10, 318 (1950)
- Malandra, B. u.S. Corbetta: Z.Zellforsch. 39, 318 (1953)
- Marenzi, A.D.: Endocrinol. 23, 330 (1938)
- Marti, M.: Probleme des Hypophysen-Nebennieren-
rinden-Systems, Berlin 1953, S. 220
- McCann, S.M. a.
J.R. Brobeck: Proc.Soc.Exper.Biol. Med.,
N.Y. 87, 318 (1954)
- McCann, S.M. a. K.L.Sydnor: Proc.Soc.Exper. Biol. Med.,
N.Y. 87, 369 (1954)
- Metuzals, J.: 1. Sympos. Dtsch.Ges.Endokrinol.,
Hamburg, 1955, S. 65
- Mirsky, A., M. Stein a.
G. Paulisch: Endocrinol. 54, 491 (1954)
Endocrinol. 54, 691 (1954)
Endocrinol. 55, 28 (1954)
- Nagareda, C.S. a.
R. Gaunt: Endocrinol. 48, 560 (1951)
- Ortmann, R.: Z.Zellforsch. 36, 92 (1951)

- Pincus, G.:** J.clin. Endocrinol. 3, 195 (1943)
- Rabinovici, N.:** Endocrinol. 49, 579 (1951)
- Romeis, B.:** Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen. Bd. VI/3. Berlin: Springer 1940, S. 503
- Ruppel, W. u. A. Hitzelberger:** Schweiz.med. Wschr. 81, 926 (1951)
- Ruppert, A.:** Z.exper.Med. 119, 229 (1952)
- Sartorius, O.W. a. K. Roberts:** Endocrinol. 45, 273 (1949)
- Sayers, G. a. M.A. Sayers:** Endocrinol. 40, 265 (1947)
- Scharrer, E.:** Separatum Experientia 10, 264 (1954)
- Scharrer, E. u. B.:** Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen. Neurosekretion. Bd. VI/5. Berlin-Götting-Heidelberg: Springer 1954, S. 956-975 u. 1025-1031
- Selye, H.:** Dtsch.Med.Wschr. 1951, 965
Dtsch.Med.Wschr. 1951, 1001
Einführung in die Lehre vom Adaptationssyndrom, Stuttgart 1953
- Slusher, M.A. a. S.Roberts:** Endocrinol. 55, 245 (1954)
- Spanner, R.:** Klin.Wschr. 1952, 721
- Staudinger, H.:** Probleme des Hypophysen-Nebennierenrinden-Systems, Berlin 1953, S. 31
- Stebbins, R.B.:** Endocrinol. 49, 671 (1951)
- Ströder, J. u. H. Zeisel:** Z.Kinderheilk. 75, 683 (1955)
- Taylor, A.B., A. Albert a. R.G. Sprague:** Endocrinol. 45, 335 (1949)

- Thorn, G.W. a.
P.H. Forsham: Am.J.med. 10, 595 u. 598(1951)
- Tonutti, E.: Verh.Dtsch.Ges.Path. 36,123 (1952)
- Weissbecker, L.: Z.mikrosk.-anat.Forsch. 51, 346 (1942); 52,32 (1942)
1. Sympos.Dtsch.Ges.Endokrinol. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1955, S. 202
Klinik der Nebennierenrindeninsuffizienz und ihre Grundlagen. Stuttgart 1954
- Westmann, A.: 1.Sympos.Dtsch.Ges.Endokrinol. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1955, S. 73 - 81
Am.J.Med. 16, 220 (1954)
- White, A.G. a. M. Kurtz: J.clin.Invest. 30, 1287 (1951)
- White, A.G., G. Rubin a. L. Leiter: J.clin.Endocrinol. 12,647(1952)
- Wilkins, R.B. a. L.D. Carlson: Endocrinol. 48, 651 (1951)
- Williams, T.L., A. Cantarow, K.E. Paschkis a. W.P. Havens: Z.physiol.Chem. 233,257(1935)
- Zimmermann, W.: Z.physiol.Chem. 245,47 (1937)
- Zimmermann, W.: Dtsch.Med.Wschr. 1951,1363
Handbuch der Inneren Medizin. Bd.VII/1. Berlin-Göttingen-Heidelberg: Springer 1955, S. 130-148
- Zimmermann, W., Anton u. Pontius: Z.physiol.Chem. 289,91 (1952)
- Zimmermann, W. u. J. Hofschlaeger: Acta endocrinol. 12,225(1953)
- Zocchi, S.: Zitiert nach Bargmann.

L e b e n s l a u f

Am 2.1.1927 wurde ich als Sohn des Kaufmanns Paul Förster und seiner Ehefrau Agnes, geb. Klinski, in Guben N.L. geboren. Von 1933 bis 1937 besuchte ich die Volksschule meiner Heimatstadt. Danach trat ich zur Gubener Oberschule über, der ich bis zu meiner Einberufung als Marinehelfer im November 1943 angehörte. 1945 setzte ich meine Schulausbildung in Berlin fort, wo ich an der damaligen Oberschule für Jungen des Verwaltungsbezirkes Berlin-Mitte im Juni 1946 das Reifezeugnis erwarb. Zum Wintersemester 1947 begann ich an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Bamberg mein Medizinstudium, das ich nach bestandenem Vor-Physikum in Regensburg an der medizinischen Außenstelle der Universität München bis zum Physikum im Wintersemester 1949/50 und an der Universität Würzburg fortsetzte. Dort legte ich 1953 das medizinische Staatsexamen ab. Seit November 1953 bin ich Assistent an der Medizinischen Klinik der Universität Würzburg. Am 1.2.1955 erhielt ich die Vollapprobation als Arzt. Mit der Durchführung der Versuche für die vorliegende Arbeit war ich vom Dezember 1953 bis April 1955 beschäftigt.

Ich versichere ehrenwörtlich, daß ich die vorliegende Arbeit selbständig verfaßt und außer der angegebenen Literatur keine weiteren Hilfsquellen benutzt habe.

Ich versichere ehrenwörtlich, daß ich bisher von keiner anderen Seite ein Dissertationsthema zur endgültigen Bearbeitung erhalten habe.

Hilbert Förster

